Canaïolo nero

Vass6R04s171-175

Collection Vassal-Montpellier

1246Mtp3

Canaïolo néro 5,12 5,14 \oplus







a dingradanta denta dan batind

DESIGNATION: Canaiolo mero

CLOS 5 PLANCHE 12 RANG 5 Souche 14

Vigueur: 2

PORT: 6718 - ½ érig - couché

Pédoncule: L - M - C

Millerandage: 0

Date de Véraison: 2-8-74

Date de Maturation: 4.9,74 + 3

Dourriture: 0

ALE: TG - G - M - P: L - M - C

EALE: TG - G - M - P: L - M - C

SALE: TG - G - M - P: L - M - C

COLETUR: B1 - Gr - Rs - Rg - M

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb.

CHARGE:

S10

S23

avec pépins - apyrène

S42

JUS: inc - coloré

DESIGNATION: Canaiolo nero CLOS 5 PLANCHE 12 RANG Souche 14 Vigueur : 2 PORT : erig - derig - couché Millerandage : O Date de Véraison: 5-8 Date de Maturité: 3-9-75 x + 3 Pourriture : 0 13 <u>GRAPPE</u> : G - M - P : L - M - C BAIE: TG - G (M)- P 16x16 disc. - (Sph.) - ell. - Ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg -(N) SAVEUR : (s)- m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 s2 s3 s4 s5 1 avec pépins - apyrène JUS : /inc.) - coloré

Canaiolo nero DISTRIBUTED . cies 5 pt. Tol. 12 man S souche 14 Vaguour , 15 2012 / 659 - conché Date de Véraicon : 23-7 Fillerandage : 0 Date de Baturité : 7.9 76 Poursiture . 0 1111 : 20 - 3 - O- P 4x - ell. - 0v. obow. - cyl. - lap 2007 10 1 D1 - 37 - 11 - 15 - 0 SAV. P.1 : 6 - m - er - for - herb. s? 0 avco (pépino) - asprine - colord

	Nombre	DATES							
	Total d'yeux	31.3 414		6-4	!	!			
1 2	P	1	!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	! ! !	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!			
3/	ij	0	1	2 1	D66-4-73x	+8			
5	4	1	1 1	2 1	1 1 6 6 - 4	!			

!!!	! ! !	Nombre Total	DATES!								
!	!!	d'yeux	20,3	27.3	!	1 1 1					
!	16!			!!!!	1	1 1 1					
1	2!	2	4	2 "	! !						
!	3!	2	0	2 "	9 T	1 1					
!	4 !	2	6	2 *	De 23.3.	1 2 1					
!	5 !	4	O	3 -	00!	! + > ! !					

Canaïolo néro Année : 1975 Emplacement 5.12 \$14 / Désignation /.....

!	Nombre !	DATES!							
!	d'yeux!	6.3	10.3	! 13,3	117.3	21.3	1 !		
1 1	: 4	1	12 -	14-	:4-	! 4 *	!!!!		
! 2	! 2	0	!0	0	0	! 0	!!!!		
3	4	1	1	12 -	! 3 -	13 4	1.6		
1 4	4	0	. 0	0	: 0	0	1+0		
5	4	0	10	0	11	12 8	!		

0619-3-75,

ANUEE: 1996 MOM Canaido Méro PMELACIDENT 5 12 514

12	124603											
whe	Nbre yeux		rrement mi/ddb		Ferti-	Flo début	raison mi/f	fin	vē. dēbut	raison mi/v		Maturité
1 2 3 4 5	1 3	4,3	18.3 ° 18.3 ° 18.3 × 18.3 × 18.3 ×	6 1	Grappe Pour : Baie : Couleu Saveur Pépins Fort :	TG - : disc-: r : P-0	M - P Mil o - M sph-el Gr-Rs- m - a	Dim 1: - P D 1-ov- Rg-N r - fo	im : obov-cy Jus	Compa yl-fus : inc	cité:	: I, + i1 -C.

Canaido nero

nlimited metallication land and

Emplacement :

Désignation :

5. 12 \$14 4-5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 1) moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Callut 72

a de la compania del compania del compania de la compania del compania del compania de la compania del comp

Désignation : Emplacement :

Cancilolor nero

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement (1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 🐔

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo 72

lantaulunti

Canaïolo nero

Désignation : Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

daniadagadadadadantad

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré () - à raics 2 - vert 3.

ventre coloré (7 - à raics 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vort 3. 51 - nocuds vontre coloré () - à raies 8 - vert 9.

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair Bonne rouge foncé 4, bane 52 - vrille

52 - bourgeon : coloré (vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo

No ordre

Canaïolo néro

Désignation

5-12514

VASSAL

Planche côté nº

souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 3.

35 2 <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 5. révoluté 4 - tourmenté (5.)

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5. plissée au point péticlaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point péticlaire rouge 2 - partiellement rouge 3 pentièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 by

- Couleur : vert jaune ! - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8

40 - coloré () - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur. à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

Calvo 74

Nº d'ordre 5-12 \$14 Désignation souche 1 2 3 (4) côté VASSAL planche GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 8 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.) 26 - Très grosse I - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière (1) irrégulière 8. 27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée () - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (1) - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde O - sphéroïde (2) ellipsoïde (2) ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant ()- non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière 6 - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 1 29 - A jus incolore (1) - coloré 2. 33 - A peau fine (3) - moyenne (4) - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7)- molle 8. 30 - A saveur neutre I - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. Avec plous 3 3I - A pédicelle long I - moyen 2) - court 3. 3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent (2).
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

33 - De séparation facile (égreneuse) (I) - difficile 2.

DESCRIPATION /

-Canaiolo nero 5-12514 A.3

SARHENT DE VIGNE

: long (), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2), moyer : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2) Boorce Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3) Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Hoouds Mérithalle de longueur moyenne : : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4).
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noevels (4) plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 76

```
Nº d'ordre: 1246.03 Désignation: Canaiolo nero
 Origine :
 Emplacement: 5 - 12 S14
8 - Angle des nervures ...... 1 - (2) - (3)
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - ② - ③.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - 2,
11 - Lobes ..... 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 3 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... (0) - (1) - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .......... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8)
16 - Dents: forme ...... ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - 3
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> EX L'<sub>3</sub> ..... 1 - 2 .. 3.
22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - 3 - 4 - 59
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                    Direction : 1 - (2) - 3.
                   Forme : (4) - 5.
```

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Jantouluuti

Formulaire de description 6/8 (après chute des feuilles)

Année 4999

Code cépage : 1246_

Code clone :03

Nom cépage : Canai olo nero

Observateur

Emplacement: 5.12514 6 Rg 4 S. 171. 175.

identendentendentanlæten!

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1)- elliptique 3 - aplatie 5.

oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - strie

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4

oiv 104 lenticelles : absentes 1)- présentes 9

oiv 105 densité des poils dressés des noeuds : absence (1) présence ()

oiv 106 densité des poils dressés des entrenoeuds : absence (1) présence 9

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (60mm) 1 - courts (90mm) 3 moyens (120mm) 5

longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (= 5mm) 1 = petit (8nm) 3) moyen (11nm) 5 - grand

(14mm) 7 - très grand (~17mm) 9

Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9

oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 aptitude à la rhizogenèse très fails le 1 - faible 3 - moyen 5 élevé 7 très élevé 9

Vassal

Noeuds: aplatis 1 - moyens(2) - saillants 3

vigueur 3 puine 2

identical material autoril metion! liminalimite

Formulaire de description 6/8 (après chute des feuilles)

Année

Code cepage 1246 Nom cepage lanailo

Code clone 03

Observateur

Emplacement: 6 Russitt- 175

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1 - elliptique 3 - aplatie oiv 102 surface : unic 1 - côtelée 2 - strice (3)

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre 🗗 ronge violacé 3 - gus 4

oiv 101 lenticelles absentes O- présentes O

oiv 105 densité des poils dressés des noeuds, absence (D- présence 9 oiv 106 densité des poils dressés des entrenoeuds absence D présence 9

orv 353 longueur entrenoeuds: très courts (-60mm) 1 - courts (90mm) 5 - aoyens (120mm) 5 longs (450mm) 7 = très longs (>180mm) 9 70 oiv 354 diamètre entrenoeuds : très petit (5mm) 1 petit (8mm) moyen (11mm) 5 - grand (14mm) 7 - très grand (-17mm) 9 - 05

Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha: tres faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - tres élevé 9. oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 faible 3 - moyen 5 - de e 7 - très élevé 9. oiv 553 aptitude à la rhizogenèse très faible 1 - faible 3 - moyen 5 éleve très élevé 9

Vassal

Noends aplatis I movens 2 - sadlants (3)